

ヒブ・小児用肺炎球菌について

接種開始年齢により接種回数・間隔が異なります。

下記をご参照ください。

ヒブワクチン	接種対象年齢
	生後2月～4歳

開始月齢・年齢	接種回数	接種間隔
生後2月～ 7月に至るまで	4回	初回接種 ：生後12月に至るまでの間に27日（医師が必要と認めるときは20日）以上の間隔をおいて3回接種（ただし、2回目・3回目の接種は、生後12月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない） 追加接種 ：初回接種終了後7月以上の間隔をおいて1回接種（ただし、3回目までを終了せずに生後12月を超えた場合は、最後の接種から27日以上の間隔をおいて1回接種）
生後7月～ 1歳に至るまで	3回	初回接種 ：生後12月に至るまでの間に27日（医師が必要と認めるときは20日）以上の間隔をおいて2回接種（ただし、2回目の接種は、生後12月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない） 追加接種 ：初回接種終了後7月以上の間隔をおいて1回接種（ただし、2回目までを終了せずに生後12月を超えた場合は、最後の接種から27日以上の間隔をおいて1回接種）
1歳～4歳	1回（接種は、5歳の誕生日前日まで）	

小児用肺炎球菌ワクチン	接種対象年齢
	生後2月～4歳

開始月齢・年齢	接種回数	接種間隔
生後2月～ 7月に至るまで	4回	初回接種 ：生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回接種（ただし、生後12月を超えて2回目の接種を行った場合は、3回目の接種は行わない） 追加接種 ：初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月以降に1回接種
生後7月～ 1歳に至るまで	3回	初回接種 ：生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて2回接種 追加接種 ：初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月以降に1回接種
1歳	2回	60日以上の間隔をおいて2回接種
2歳～4歳	1回（接種は、5歳の誕生日前日まで）	